

Instrukcja pobierania wymazu z ucha

- Wskazaniem do pobrania wymazu z ucha jest podejrzenie ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ) oraz zakażenie ucha zewnętrznego

Pobieranie materiału

- W przypadku OZUŚ wiarygodnym materiałem jest płyn z ucha środkowego pobrany drogą paracentezy (nakłucia błony bębenkowej) lub treść ropna uzyskana po samoistnej perforacji – zabieg wykonywany wyłącznie przez lekarza
- Zakażenie ucha zewnętrznego może dotyczyć małżowiny usznej i/lub przewodu słuchowego zewnętrznego
- Umyć i zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki
- Przed pobraniem materiału za pomocą jałowych gazików nasączonych roztworem jałowej soli fizjologicznej oczyścić małżowinę i przewód słuchowy z zaschniętej wydzieliny.
- Wymazówkę zwilżyć kilkoma kroplami roztworu soli fizjologicznej.
- Materiał pobrać z miejsc zmienionych chorobowo obracając kilkakrotnie wymazówkę.
- Umieścić wymazówkę w podłożu transportowym.
- Zdjąć rękawiczki, zdezynfekować ręce.
- Opisać probówkę danymi pacjenta.

Transport

- Materiał najlepiej dostarczyć w ciągu 2h od pobrania w temperaturze pokojowej, maksymalnie do 24h.