

Instrukcja pobierania wymazu z oka

- Wymaz z oka pobierać w przypadku podejrzenia bakteryjnego/grzybiczego zakażenia narządu wzroku; infekcje mogą dotyczyć różnych struktur anatomicznych gałki ocznej, oczodołu, narządów chroniących oko.
- Badanie powinno być pobrane przez lekarza okulistę.
- Przed pobraniem materiału nie należy stosować kropli z antybiotykiem czy sterydem przez minimum 24h.

Pobieranie materiału

- Umyć i zdezynfekować ręce, założyć jednorazowe rękawiczki.
- Przed pobraniem, jeśli jest takie wskazanie, oczyścić powieki i ujście spojówek z zaschniętej wydzieliny za pomocą jałowych gazików nasączonych jałową solą fizjologiczną.
- Wymazówkę zwilżyć kilkoma kroplami roztworu soli fizjologicznej.
- Rozchylić powieki i pobrać materiał z ujścia worka spojówkowego kilkakrotnie obracając wymazówkę.
- Wskazane jest pobranie wymazu z obu oczu za pomocą odrębnych wymazówek, mimo iż zmiany występują tylko w jednym z nich (oznaczyć w którym oku występują zmiany).
- Zdjąć rękawiczki i zdezynfekować ręce.
- Opisać probówkę danymi pacjenta.

Transport

- Materiał najlepiej dostarczyć w ciągu 2h od pobrania w temperaturze pokojowej, maksymalnie do 24h.